

**Vážené kolegyně a kolegovia!**

**REMIUM, s.r.o. Bardejovské Kúpele ponúkajú do Vašej pozornosti metodiku tranzientnej elastografie, ktorá je od 2.12.2011 dostupná na našej Internej ambulancii so zameraním na choroby pečene.**



Princípom **tranzientnej elastografie** je stanovenie tzv. tuhosti pečene (*liver stiffness*), ktorá vyjadruje stupeň fibrózy pečene. Ide o neinvazívnu metódu, ktorá bola prijatá a štandardizovaná na výročnom európskom hepatologickom kongrese v Kodani v roku 2009 a odporučená Európskou asociáciou pre štúdium pečene (EASL) ako štandardná a bezpečná metóda na stanovenie stupňa fibrózy pri vybraných chorobách pečene. Tranzientná elastografia predstavuje **alternatívu biopsie pečene** pre stanovenie stupňa fibrózy pečene.

**V Remedium, s.r.o. Bardejovské Kúpele máme k dispozícii najmodernejší typ prístroja na vykonávanie tranzientnej elastografie FibroScan 502 touch, ktorý je momentálne v Európe dostupný len na niekoľkých špičkových hepatologických pracoviskách.**

**Disponujeme 3 sondami: M-sonda - na vyšetrenie populácie s bežným obvodom hrudníka, S-sonda - detská sonda (JEDINÁ NA SLOVENSKU) a XL-sonda - na vyšetrenie obéznych dospelých ľudí. Vyšetrenie je nebolestivé, ľahko opakovateľné, nevyžaduje pacienta nalačno, trvá krátko (5-10 minút).**

Používa sa pri posudzovaní stupňa fibrózy pečene (podľa klasifikácie Metavir) pri chronickej hepatitíde B a C, chronických cholestatických chorobách, alkoholovej chorobe pečene, NAFLD (nealkoholovej tukovej chorobe pečene). S vysokou presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu pečene.

Vyšetrenie sa dá použiť aj v rámci monitorovania stavu pacienta, ale aj ako skrining chorôb pečene (napr. pri zvýšenej aktivite aminotransferáz, pri USG náleze tzv. zväčšenej pečene).

**Záujem o dohodnutie termínu vyšetrenia (FS) je možné realizovať na t.č. 054/4773402.**

Cena vyšetrenia: 13 Eur.

Na spoluprácu s Vami sa teší

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.